



함께 꿈꾸며 성장하는 행복한 기능명장 육성

# 가정통신문

학교 351-1518  
351-1517  
FAX 353-1591  
www.jbut.hs.kr

## 제 목

고등학교 3학년 코로나19 예방접종 안내

학부모님 안녕하십니까?

코로나19 예방접종은 2학기 전면등교 및 안전한 대입(수능 및 대학별고사 등) 지원을 위하여 실시합니다. 본교 **3학년 학생은 7월19일(월) 장수군 한누리전당에서 화이자백신** 접종을 실시할 예정입니다. 아래 안내사항을 자세히 읽어보시고 코로나19 예방접종이 원활하게 완료될 수 있도록 부탁드립니다.

대상	고등학교 3학년 및 교직원
장소	장수군 장수읍 한누리전당 산디관 (장수읍 한누리로 393) ※ 장수군 보건의료원, 장수소방서 협조(119 구급차 대기)
일정	2021. 7. 19. (월)  · 08:50 - 학교에서 버스 탑승 · 09:10 - 장수 한누리전당 도착 · 09:50 - 학교로 출발 · 10:10 - 학교 도착

## ■ 코로나19 예방접종 전 주의사항은 무엇인가요?

- ▶ 건강 상태가 좋을 때 코로나19 백신을 접종받는 것이 중요합니다
- ▶ 다음과 같은 경우는 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다.
  - 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스\*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
  - 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 첫 번째 백신과 동일종류 백신으로 접종 금기
  - 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 백신 접종 등에 대한 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 자세히 기록해 주세요!
- ▶ 첫 번째 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 심근염 발생이 확인된 경우 안전성에 대한 근거 마련될 때까지 코로나19 백신 접종을 연기합니다.
- ▶ 다음과 같은 경우는 예방접종을 연기합니다.
  - 코로나19 감염이 의심되는 경우 선별진료소 등을 통해 신속히 진단검사를 받으셔야하며, 결과가 나올 때까지 예방접종을 연기합니다.
  - 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자는 격리해제 될 때까지 예방접종을 연기합니다.
  - 발열(37.5°C 이상) 등 급성병증이 있는 경우 증상이 없어질 때까지 예방접종을 연기합니다.

## ■ 코로나19 예방접종 후 주의사항은 무엇인가요?

- ▶ 예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰합니다.
- ▶ 예방접종 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰합니다.
- ▶ 예방접종 후 4주간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 바로 의사의 진료를 받도록 합니다.
- ▶ 예방접종 후 2일 정도는 고강도 운동 및 활동, 음주를 삼가시고, **접종부위는 청결히 유지합니다.**
- ▶ 어르신인 경우, 예방접종 후 혼자 있지 말고 다른 사람과 함께 있어 증상발생 시 도움을 받을수 있도록 합니다.

## ■ 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?

- ▶ 코로나19 예방접종 후 예상 가능한 국소반응으로 접종부위 통증이나 부기, 발적 등이 있으며, 전신반응으로 발열, 피로감, 두통, 근육통, 메스꺼움·구토 등이 나타날 수 있습니다.
  - 접종 후 흔히 나타나는 반응으로 대부분 2~3일 이내 증상이 사라집니다.
- ▶ ① 드물게 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 몸 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상을 동반한 **아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응**이 나타날 수 있으며, ② 바이러스백터 코로나19 백신(아스트라제네카, 안센) 접종 후 매우 드물게 혈소판감소성 혈전증\*이나 모세혈관 누출 증후군이 발생할 수 있고, ③ mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 매우 드물게 심근염/심낭염이 발생할 수 있습니다.  
(\*혈소판감소성 혈전증은 바이러스백터 백신 접종 후 4일에서 4주사이에 주로 발생)

## ■ 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 하나요?

- ▶ 예방접종 후 다음과 같이 하면 도움이 됩니다.
  - 예방접종 후 **접종부위 부기, 통증**이 있는 경우 깨끗한 **마른 수건**을 대고 그 위에 **냉찜질** 하세요.
  - 예방접종 후 **미열**이 있는 경우 **수분을 충분히 섭취**하고 휴식을 취하세요.
  - 예방접종 후 **발열**이나 **근육통** 등으로 불편함이 있는 경우 **해열진통제**를 복용하시면 도움이 됩니다.
    - 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열진통제를 준비하고, 예방접종 후 몸살 증상이 있으면 해열진통제를 복용하세요.
- ▶ 다음과 같은 경우에는 **의사의 진료를 받으세요.**
  - 바이러스 백터 백신(아스트라제네카, 안센) 접종 후 아래의 증상이 있는 경우
    - 심한 또는 2일 이상 지속적인 두통이 발생하며, 진통제에 반응하지 않거나 조절되지 않는 경우 또는 구토를 동반하거나 시야가 흐려지는 경우
    - 호흡곤란, 흉통, 지속적인 복부 통증, 팔·다리 부기와 같은 증상이 나타난 경우
    - 접종부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우 등
    - 급격한 팔·다리의 부종, 갑작스러운 체중증가
  - mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 아래의 증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
    - 가슴통증, 압박감, 불편감
    - 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증
    - 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림
    - 실신
  - 기타 의사의 진료가 필요한 경우
    - 코로나19 예방접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타난 경우
    - 접종부위의 통증, 부기, 발적이 48시간 이후에도 악화되는 경우
- ▶ 다음과 같은 경우에는 **119로 연락**하거나 **가까운 응급실**로 내원하시기 바랍니다.
  - 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
  - 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
  - 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우
- ☞ 이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

2021.7.14.

전북유니텍고등학교장

