


보건소식지 제 2023-15 호	<b>유행성 눈병 예방관리 안내</b>	
보건실	우) 560-293 전주시 완산구 능안자구길 55 ☎교무실220-9202~3. ☎ 보건실 220~9267. Fax 222~1902	

○ 여름철 유행성 눈병 미리 알고 예방하자!

 <p><b>유행성 눈병</b></p> <p>눈 가리는 학교 교육중으로만 사들 가습합니다.</p>	 <p><b>유행성 눈병의 종류</b></p> <p>유행성각결막염 아데노바이러스 (주로 8형, 19형, 37형)</p> <p>아폴로 눈병 엔테로바이러스 70형 콕사키바이러스 A24 Variant형</p>
 <p><b>유행성 각결막염</b></p> <p><b>정의</b> 아데노바이러스에 의해 결막에 생긴 급성 염증성 결막 질환</p> <p><b>전파경로</b> 유행성 환자와 직접적인 접촉 환자가 사용한 물건(세면도구) 등 간접 접촉 수영장 및 욕목탕 등 물을 통한 전파</p>	 <p><b>아폴로 눈병</b></p> <p><b>정의</b> 바이러스에 의한 결막의 급성 출혈성 염증</p> <p><b>전파경로</b> 유행성 환자와 직접적인 접촉 분비물로 오염된 손이나 물건(세면도구) 등 간접 접촉 수영장 및 욕목탕 등 물을 통한 전파</p>
 <p><b>유행성 각결막염</b></p> <p><b>잠복기</b> 5~12일</p> <p><b>증상</b> 눈곱, 이물감, 눈꺼풀 부종, 충혈, 동통, 눈물, 눈부심 등</p> <p><b>합병증</b> 시력저하, 안구건조증, 눈꺼풀과 결막의 유착 발생, 눈꺼풀 처짐</p>	 <p><b>아폴로 눈병</b></p> <p><b>잠복기</b> 1~2일</p> <p><b>증상</b> 갑작스러운 이물감, 충혈, 눈부심, 다량의 눈물 등</p> <p><b>합병증</b> 드물게 엔테로바이러스 70형의 경우, 발병 후 6~12개월 후 사시마비 또는 뇌신경마비 발생 가능</p>
 <p><b>유행성 눈병 치료</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 감염 시 눈을 피로하게 하는 일은 제한하고 <b>안정을 취하기</b></li> <li>2 다른 사람에게 감염시키지 않도록 유의하기</li> <li>3 안대는 눈의 온도를 높여 세균증식을 유발하므로, 꼭 필요한 경우를 제외하고는 착용하지 않기</li> <li>4 손 씻기 등 개인위생을 철저히 지키기</li> <li>5 눈 분비물을 닦을 때는 가급적 <b>자기 손수건</b>을 사용함</li> <li>6 치료용 안약은 다른 사람과 함께 사용하지 않음</li> </ol>	 <p><b>유행성 눈병 예방수칙</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 흐르는 물에 비누나 세정제로 <b>30초 이상</b> 손씻기</li> <li>2 눈을 만지거나 비비지 않기</li> <li>3 수건, 베개, 담요, 안약, 화장품 등 개인소지품을 다른 사람과 함께 사용하지 않기</li> <li>4 눈병이 유행할 때는 수영장 등 사람 많은 곳에 가지 않기</li> </ol>

2023. 7. 12

완 산 고 등 학 교