



백산중 2025-008
교무실 063)582-2046
행정실 063)584-2053

가 정 통 신 문
<https://school.jbedu.kr/whitesan>
교무실 063-582-2046, 행정실 063-584-2053
팩 스 063-583-4647
(56323) 전북 부안군 백산면 백산로 379



주 제 : 학생, 교직원 및 학부모 대상 감염병 예방 방역수칙 준수 가정통신문

학부모님 안녕하십니까?

학부모님 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

최근 교육부와 질병관리청에서는 신학기 감염병 확산 차단 및 예방관리를 위해 안내 하오니 감염병 예방 및 전파 차단에 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 예방접종의 중요성

건강한 학교생활을 위해 초·중학교 입학생 예방접종 완료해야

- 필수예방접종기록 확인 후 미접종자는 접종 완료, 전산 등록 누락자는 전산 등록
- 접종 완료하지 못한 경우, 입학 전·후 보호자 및 입학생에 접종 독려 예정

질병관리청(청장 지영미)은 학생들의 감염병 예방과 건강 보호를 위해 꼭 필요한 예방접종항목(초등학교 4종*, 중학교 3종**)을 지정하고 비용을 지원하여 적극 접종토록 하고 있다.

- (초등) 2018년 출생자 및 의무 취학예정자, (중등) 2012년 출생자 및 입학 예정자
- ** DTaP(디프테리아/파상풍/백일해) 5차, IPV(폴리오) 4차, MMR(홍역/유행성이하선염/풍진) 2차, 일본뇌염(불활성화 백신 4차 또는 약독화 생백신 2차)
- *** Tdap(파상풍/디프테리아/백일해) 6차(단, 백일해 백신 금기자는 Td 접종), 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차), HPV(사람유두종바이러스 감염증) 1차 (여학생 대상)

아울러 2001년부터 교육부(부총리 겸 장관 이주호)와 협력하여 매년 초·중학교 입학생의 필수예방접종기록을 확인하여 접종을 완료토록 독려하는 사업을 펼치고 있다.

□ 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 안내

STEP.1
예방접종도우미 누리집에서 예방접종 기록 확인하기

초등학생 4종 DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차, 일본뇌염

중학생 3종 Tdap 6차*, 일본뇌염, HPV 1차(여아)
* 단, 백일해 백신 금기자는 Td 접종 가능

STEP.2
미완료자는 위탁의료기관 또는 보건소에서 예방접종 무료로 하기
* 방문 전 접종 가능 여부 확인 필요



2. 노로바이러스감염증 올바른 손씻기로 예방

〈노로바이러스감염증 행동수칙〉

일상생활 시	환자 발생 시
① 올바른 손씻기(외출 후, 식사 전, 배변 후, 30초 이상 흐르는 물에 비누로 손씻기) ② 채소·과일은 흐르는 물에 깨끗이 씻어 먹고, 껍질은 벗겨 먹기 ③ 음식물은 충분히 익혀 먹기(85℃ 이상에서 1분 이상 가열) ④ 끓인 물 마시기 ⑤ 위생적으로 조리하기 - 칼·도마는 소독하여 사용 - 조리도구는 구분(채소용, 고기용, 생선용)하여 사용	① 환자는 증상 소실 후 48시간 이상 등원, 등교 및 출근 제한 권고 ② 노로바이러스 감염증 환자와 공간을 구분하여 생활하도록 권고 ③ 배변 후 변기 뚜껑을 닫고 물을 내리기 ④ 환자가 발생한 경우 구토물, 접촉환경, 사용한 물건 등에 대한 염소 소독 - 가정용 락스 희석액(락스1: 물 50)으로 염소 소독 - 세탁물은 70℃ 이상에서 세탁하거나, 락스 희석액(락스1: 물 330)으로 5분 이상 행굼 ⑤ 올바른 손씻기로 개인위생 준수

○ 가정환경 내 소독

가정 내 소독은 어떻게 해야 할까요?

◆ 0.1%(1,000ppm) 소독약을 만듭니다 (시판용 락스를 사용하는 경우).
 - 2ℓ (또는 2.5ℓ) 페트병+시판용 락스(종이컵 1/3컵)

소독할 장소 또는 물건	부위·종류 등	소독방법
화장실, 세면대, 욕실	대소변기, 배수용 레버, 손잡이, 수도꼭지, 욕조	세제 등으로 더러워진 곳을 닦은 후 묽은 소독액을 뿌린 후 10분 후에 물로 씻어낸다.
구토물 또는 분변이 뒹글소, 더러워진 손으로 만든 장소 등	마루, 벽, 문손잡이, 전화기 등	묽은 소독액을 종이타월 등으로 묻혀 닦고 10분 후에 물(깨끗한 물길레)로 닦아낸다.
구토물 또는 분변으로 더러워진 곳(잠옷, 속옷, 시트 등)	잠옷, 속옷, 시트, 천 기저귀 등	더러워진 곳을 닦아 묽은 소독액에 30분 정도 담근 후 세탁한다. 젖은 수건을 대고 스팀 다리미로 85도, 1분 이상 가열하는 것도 효과 있음.
구토물 또는 분변과 접촉한 물건	마스크, 앞치마, 종이타월	쓰레기봉투에 넣어 버린다.

◆ 완료 후에는 비누를 이용하여 30초 이상 올바른 손씻기를 합니다.



2023.11.29. 질병관리청

— 추운 겨울 날씨에도 유행하는 —

노로바이러스 감염증 예방수칙

노로바이러스는 일상 환경에서도 생존이 가능하고,
감염력이 높아 예방과 대응이 중요합니다.

개인위생 지키기



비누로 30초 이상
손 자주 씻기



변기 뚜껑 닫고
물 내리기

안전하게 조리한 음식 먹기



음식은 충분히
익혀먹기



증상이 있다면
식사 준비하지 않기

증상이 나타나거나, 환자가 발생했다면?
* 주요 증상: 오심, 메스꺼움, 구토, 설사, 복통, 오한, 발열, 근육통

공간 구분하기



증상이 있다면
집에서 쉬기



환자와
생활공간 분리하기

환경 소독하기



자주 접촉하는
물건 소독하기
(짜장면, 호 손잡이, 전화기 등)



소독 시 마스크 및
장갑 착용하기

 집단발생이 의심되는 경우, 관할 보건소에 신고하기!

2025. 03. 05.

백 산 중 학 교

