



백산중 2022-016

교무실 063)582-2046

행정실 063)584-2053

청소년(12-17세) 코로나19 3차접종 가정통신 안내문



1

추진배경

- 오미크론변이로 인한 청소년 확진자 급증에 따라 기초접종 후 시간이 경과한 12~17세 청소년 대상 3차 접종 추진

2

추진개요

<기본 원칙>

- (접종대상자) 보호자 및 본인의 자발적 동의에 의한 개별 예방접종
- (접종기관 및 보건소) 안전접종 시행, 접종 후 이상반응 신속대응을 위한 사전 준비 및 적시 대응

- **접종대상 : 기본접종 완료 후 3개월(90일)이 경과한 12~17세**

* 12~17세 : '05.1.1.-'10.12.31. 출생자 (단, 2010년생은 생일 이후 3차 접종가능)

- 고위험군(면역저하자*, 기저질환자) 적극권고, 그 외 일반 청소년도 희망자에 한해 접종가능

[12~17세 중 접종이 필요한 고위험군 범위]

- 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- 당뇨, 비만, 면역저하자(면역억제제 복용자)
- 만성질환으로 사회복지시설 등 집단시설에서 치료, 요양, 수용 중인 청소년
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 12-17세 청소년으로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고

* 면역저하자는 입원·치료 등 담당의사 또는 위탁의료기관 의사와 상의 후 2개월

- **백신종류 : mRNA 백신(화이자)**

* 청소년 3차 접종은 화이자 백신으로 기본 접종과 동일용량

- **접종방법 : 사전예약 후 위탁의료기관·예방접종센터에서 접종**

- 위탁의료기관 및 예방접종센터가 없는 지역은 시군구 자체계획 수립된 보건소(지소)에서 접종 가능(60일)로 단축 가능
- 건보 미가입자도 위탁의료기관 접종 가능하며 시행비는 국비 지급

- **접종일정 : (사전예약) 3.14일, (접종개시) 3.21일, (당일접종) 3.14일~**

- (예약 및 접종방법) 온라인(본인 및 대리예약, ncvr.kdca.go.kr), 전화예약(1339, 지자체콜센터)후 예약일에 개별적으로 접종기관 방문하여 접종 또는 당일접종
 - 사전예약기간 : 3.14.(월)부터 지속
 - 접종기간 : 당일접종 3.14.(월)부터 지속, 예약접종은 3.21부터 가능

- (예약변경) 접종일 기준 2일전까지 예약자가 콜센터(1339) 또는 지자체, 누리집에서 직접 변경 가능하며, 이후 변경은 예약한 접종기관, 관할보건소에서 변경
- 면역저하자 청소년(12-17세)의 경우 접종간격을 3개월(90일)에서 2개월(60일)로 변경시 의사소견서 확인 후 관할보건소에서 변경 가능

□ 접종시행

- 접종 하루 전 국민비서 알림 발송, 접종 당일 신분증*을 지참
 - * 기간 만료 전 여권, 유효기간 내 청소년증(청소년증 발급신청 확인서), 학교생활기록부 개인 신상 페이지(학교장 확인 필요), 학생증, 재학증명서 등 사진이 부착되고 주민등록번호가 명시된 신분증
- ① 보호자와 함께 방문하는 경우 접종기관에서 예진표를 작성하고 접종
- ② 보호자 미동반 시 보호자가 사전에 접종 시행 동의서 및 예진표를 작성하고, 접종대상자가 접종 당일 의료기관에 제출
 - ※ 접종 시행 동의서 및 예진표는 의료기관에서 5년 간 보관

□ 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?

- ① 접종 전
 - ▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기
 - ▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기
 - 코로나19 감염이 의심되는 경우
 - 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자
 - 발열(37.5℃ 이상)등 급성병증이 있는 경우
 - 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우
- ② 접종 후
 - ▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기
 - ▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기
 - ▶ 접종부위 청결하게 유지하기
 - ▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기

단 ! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
 - * 아나필락시스: 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 몸 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상을 동반한 심각한 알레르기 반응
- ★ 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요★

2022. 03. 25.

백 산 중 학 교 장

