



진 실 (참)  
용 감 (힘)  
봉 사 (덕)

# 가정 통신문

<http://www.wonkwang.hs.kr>

원 광 고 등 학 교

전북 익산시 무왕로 31길 139  
TEL (063) 832-6612  
FAX (063) 832-6296

담당부서	보건실	담당자	이O경	연락처	063-830-1414
------	-----	-----	-----	-----	--------------

## 성홍열 예방 및 관리 수칙 안내



제 2025-73호

학부모님 안녕하십니까?

최근 성홍열 환자 발생이 전년 동기 대비 크게 증가\*하고 있으며, 특히 유치원과 학교 등 소아 집단시설에서는 집단 발생 가능성이 높아 예방과 관리에 각별한 주의가 필요한 상황입니다.

\*25. 5. 24. 기준: 성홍열 신고 건수 3,809건, 전년 동기 대비 (1,506건) 대비 약 2.5배 증가

이에 따라, 성홍열 예방과 감염 확산 방지를 위한 예방·관리 수칙을 다음과 같이 안내드리오니, 자녀의 건강 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

성홍열 질병 개요	
병원체	A군 베타 용혈성 연쇄구균 (2급 법정 감염병)
전파 경로	<ul style="list-style-type: none"> <li>환자의 호흡기 분비물과 직접 접촉</li> <li>환자의 호흡기 분비물과 손이나 물건을 통한 간접 접촉</li> </ul>
주요 증상	<ul style="list-style-type: none"> <li>인후통에 동반되는 갑작스런 발열, 두통, 식욕부진, 구토, 인후염 등</li> <li>발진: 1~2일째 작은 좁쌀 크기로 입주위 및 전신(손발바닥 제외)에 발생했다가 3~4일 후 사라지기 시작</li> <li>붉은 얼굴: 얼굴은 홍조가 나타나나 입 주위는 창백</li> <li>혀: 처음에는 회백색에서 발병 후 2~3일이 지나면 붉은색(딸기모양의 혀)</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
성홍열 예방·관리 수칙	
예방	<ul style="list-style-type: none"> <li>예방 백신 없음</li> <li>일반적 예방                             <ul style="list-style-type: none"> <li>올바른 손씻기: 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기</li> <li>기침 예절: 기침이나 재채기는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기, 발열 및 호흡기 증상이 있으면 마스크 쓰기</li> <li>수건, 물컵, 식기구 등 개인용품 공유하지 않기</li> <li>환경소독: 가구 표면, 장난감, 손잡이, 수도꼭지 등 자주 청소, 소독하기</li> </ul> </li> </ul>
관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>의심자 관리: 발열, 인후통 등 성홍열 의심 증상이 있다면 빠른 시일 내 의료기관 진료</li> <li>환자관리: 항생제 치료 시작 후 24시간까지 격리</li> <li>접촉자관리: 연쇄구균 감염 후 사구체신염 유행 의심 시 보균자는 항생제 치료 고려</li> </ul>

2025. 6. 12.

원 광 고 등 학 교 장

갑자기 열과 발진?

# 성홍열 유행 주의

전년 동기간 대비  
신고건수 2.5배 증가!

- ! **10세 미만 어린이에게 주로 발생,**  
어린이집·유치원 등 **집단시설** 특히 주의!
- ! **손 씻기 및 기침예절 등 예방수칙** 교육과  
**집단생활시설의 철저한 관리**가 필요합니다.

## 성홍열 주요 증상



발열, 인후통



좁쌀 모양 발진



딸기혀

## 성홍열 예방·관리수칙

비누로 30초 이상  
흐르는 물에 손 씻기기침할 땐  
옷소매로 가리기문 손잡이, 장난감  
자주 소독하기

! 의심증상 시 빠르게 병원 진료를 받고,  
항생제 치료 후 최소 24시간 등원·등교를 금지해 주세요.