



가 정 통 신 문

발행호수 제2025-38호
 발행일 2025. 5. 8.
 발행인 최 용 호
 편집부 보 건 실

☎ 주소: 55133 전주시 완산구 양지2길 11-16(평화동2가) ☎ 226-0052(교무실) FAX 226-0055

학부모님 안녕하십니까

최근 수두 및 유행성 이하선염 등 봄철 빈발 감염병의 유행이 우려되고 있어 이에 대한 정보를 제공합니다.

질병 예방수칙은 손씻기(흐르는 물에 30초 이상 비누로 씻기), 기침예절(기침 시 휴지나 옷소매로 입/코 가리기), 의심증상 시 마스크 착용하기 입니다. 등교 전 수두(발진, 발열, 권태감 등) 또는 유행성 이하선염(발열, 이하선의 종창이나 동통)의 의심증상이 인지되면 담임교사에게 연락 후, 병원진료를 받도록 협조 바랍니다. 감사합니다.

수두

질병관리청

개요

- ▶ 수두 바이러스에 의한 급성 발진성 감염질환



감염경로

- ▶ 환자의 수포액과 직접 접촉 (피부 병변이 주요 감염 전파원)
- ▶ 환자의 호흡기 분비물을 에어로졸로 흡입
- ▶ 급성 수두 또는 대상포진 환자의 피부병변 수포액을 에어로졸로 흡입



증상

- ▶ 대부분 15세 미만에서 발생하며, 감수성이 있는 사람 대부분 발진이 나타남



예방법

- ▶ 소아는 생후 12~15개월에 수두 백신 1회 접종 (13세 이상 미접종자는 4~8주 간격 2회 접종)
- ▶ 성인은 4~8주 간격 2회 접종



유행성 이하선염

질병관리청

개요

- ▶ 유행성 이하선염 바이러스 (Mumps virus) 감염에 의하여 나타나는 이하선 부종이 특징적인 급성 발열성 질환



감염경로

- ▶ 비말전파, 오염된 타액과 직접접촉
- ▶ 전염기간은 이하선염 발현 3일 전부터 발현 후 5일까지



증상

- ▶ 4세~12세 학령기에서 주로 발생하며, 발열, 편측 혹은 양측 이하선의 종창이나 동통이 특징
- ▶ 약 20%는 무증상 감염자, 일반적으로 30~40%에서 이하선 침범



예방법

- ▶ 면역의 증거*가 없는 성인은 적어도 1회 접종

* 유행성 이하선염이 포함된(MMR) 백신 접종력, 유행성 이하선염 진단 이력, 유행성 이하선염 항체 양성



2025. 5. 8.

전주양지중학교장(직인생략)