

Q1

원숭이두창은 사람에게 어떻게 전파되나요?

- ☑ 원숭이두창은 인수공통감염병으로
동물→사람, 사람→사람, 감염된 환경→사람으로 전파됩니다.
- ☑ **피부상처 또는 점막을 통한 감염원과의 직접 접촉**으로 감염이
될 수 있습니다.

- 감염 환자의 **혈액 또는 체액**(타액, 소변, 구토물 등)
- 환자의 **혈액이나 체액**으로 오염된 옷, 침구류, 감염된 바늘 등
- 감염된 설치류(쥐, 다람쥐, 프레리도그 등), 원숭이 등 동물



Q2

원숭이두창의 주요 증상은 무엇입니까?

- ☑ **발열**, 두통, 근육통, 요통, 근무력증, 오한, 허약감, 림프절 병증 등을 시작으로 **1-3일 후에 얼굴 중심으로 발진증상**을 보이며, **몸의 다른 부위(특히 사지)로 발진이 확산됩니다.**
- **구진성 발진***은 수포→농포→가피 등의 단계로 진행되며, **동일한 신체부위 내 발진은 주로 같은 진행 단계**를 보입니다.
* 동그란 붉은 반점 같은 발진
- ☑ 증상은 **감염 후 5~21일(평균 6~13일) 이내**에 나타나며, **2~4주간 지속**됩니다.



Q3

원숭이두창의 감염을 예방하려면 어떻게 하나요?

- ☑ **마스크 착용 및 개인위생수칙(손 씻기 등)을 준수**하고
씻지 않은 손으로 눈, 코, 입, 점막 부위를 만지지 마세요.
- ☑ **원숭이두창 발생지역 방문을 자제**하고, 부득이하게 방문할
경우 **개인보호구(장갑, 마스크)를 사용**하세요.
- ☑ **야생동물과의 접촉을 자제**하고, **야생고기 취급·섭취에
주의**해주세요.

